

[illegible]

ADDITIONAL PARAMETER / THERAPI	SKALA NYERI															SKALA NYERI
URINE OUTPUT																URINE OUT PUT
INITIAL OBSERVER																

0 - 4 LOW	Pasien dalam kondisi stabil PER 12 JAM
3 - 4 (3 In Any Parameter) LOW MEDIUM	Pengkajian ulang harus dilakukan oleh Perawat Primer/ PJ Shift dan bisa lapor dr jaga. Jika skor pasien akurat maka perawat primer atau PP harus menentukan tindakan terhadap kondisi pasien dan melakukan pengkajian ulang setiap 4 - 6 jam oleh perawat pelaksana. Pastikan kondisi pasien tercatat di catatan perkembangan pasien
5 - 6	Pengkajian ulang harus dilakukan oleh Perawat Primer/ PJ Shift dan diketahui oleh dokter jaga residen. Dokter jaga residen harus melaporkan ke DPJP dan memberikan instruksi tatalaksana pada pasien tersebut. Perawat pelaksana harus memonitor tanda vital setiap per 1 jam sampai per 2 jam
≥ 7 HIGH	Aktifkan code blue, TMRC melakukan tata laksana kegawatan pada pasien, dokter jaga / DPJP diharuskan hadir disamping pasien dan berkolaborasi untuk menentukan rencana perawatan pasien selanjutnya. Perawat pelaksana harus memonitor tanda vital terus menerus - setiap per 1 jam